



ООО «ЭДАС»

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

АЛИПИД ЭДАС-907

Регистрационный номер: P N002985/01

Торговое наименование. АЛИПИД ЭДАС-907

Лекарственная форма. Гранулы гомеопатические.

Состав на 100 г гранул:

Активные компоненты:

Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) (Кальциум карбоникум Ганеманни (Конхе)) С6, Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) (Цимицифуга рацемоза (Цимицифуга)) С6, Fucus vesiculosus (Fucus) (Фукус везикулозус (Фукус)) С3, Graphites (Графитес) С6, Strychnos ignatii (Ignatia) (Стрихнос игнации (Игнация)) С12.

Вспомогательное вещество:

гранулы сахарные – 100,0 г.

Описание. Однородные гранулы шаровидной формы, белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие. Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав активными компонентами.

Показания к применению. Комплексное лечение предрасположенности к полноте, ожирения 1-2 ст.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью. Пациентам с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания. В связи с отсутствием специальных исследований, противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы. Препарат принимать вне приема пищи. 5 гранул положить под язык и держать до полного растворения 3 раза в сутки.

Курс лечения препаратом от 3 до 6 месяцев.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

При отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка. Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания. Привыкания к препарату или «синдрома отмены» не отмечено.

Содержание углеводов в разовой дозе препарата соответствует примерно 0,014 ХЕ, в максимальной суточной дозе – примерно 0,043 ХЕ.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Препарат действует быстрее и эффективнее, если применяется при возникновении первых симптомов заболевания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска. Гранулы гомеопатические.

По 20 г в банке полимерную из ПНД с барьерным типом запирания и с системой контроля первого вскрытия, или в банке полимерную из ПНД с навинчиваемой крышкой, или в банке полимерную из ПНД с крышкой натягиваемой и с системой контроля первого вскрытия.

Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска. Без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭДАС» (ООО «ЭДАС»)

117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 5.

Телефоны: 8-800-333-55-84, 8 (499) 237-22-95.

www.edas.ru